


# Ptačí chřipka


## Preventivní opatření v drobnochovech

Jaro a podzim jsou období, kdy dochází k migraci volně žijících ptáků, zvláště pak vodních. V tomto období existuje zvýšené riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže.

Proto je nutné zajistit, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování preventivních opatření v chovech.




1. Držte drůbež v uzavřených objektech. Krmivo a vodu podávejte v uzavřeném přístřešku.



2. Zabraňte přístupu volně žijících ptáků, hlodavců i jiných zvířat do chovu (plachty, sítě).



3. Dodržujte osobní hygienu. Převlékání, přezouvání, mytí rukou při vstupu ze dvora do domu.



4. Sledujte zdraví drůbeže. Zvýšené hynutí, netečnost, průjem, otoky okolo očí a hřebínku, těžké dýchání mohou být příznaky chřipky.



5. Zvýšené úhyny drůbeže nahláste Státní veterinární správě nebo svému veterinárnímu lékaři.



6. S podezřelou a uhynulou drůbeží (ptáky) manipulujte opatrně a pouze s použitím ochranných prostředků (rukavice, gumové holínky).



Více informací  
o ptačí chřipce  
naleznete na  
[www.svscr.cz](http://www.svscr.cz)